

13. TABLAS

Tabla No. 1 Variables sociodemográficas en pacientes con delirium y sin el evento

Variable	Casos (n=67)	% ^a	Controles (n=134)	% ^a	Datos no encontrados (% ^a)	<i>p</i>
Género^b					0	
Masculino (%)	22	32.8	44	32.1		
Femenino (%)	45	67.2	90	67.9		
Edad (años)^b					0	
Promedio	82		80			
Desviación estándar	9.1		8.3			
IMC (kg/m2)					31 (15.4)	0.499
Promedio	23.9		24.8			
Desviación estándar	4.6		3.6			
Estado civil					36 (17.9)	0.001
Soltero	4	5.9	11	8.2		
Casado	28	41.7	75	55.9		
Viudo	27	40.2	20	14.9		
Escolaridad					52 (25.8)	0.270
Primaria	28	41.7	41	30.5		
Secundaria	13	19.4	30	22.3		
Superior	19	28.3	18	13.4		

^a Los valores mostrados corresponden a porcentajes válidos

^b El sexo y la edad fueron variables pareadas entre los casos y los controles

Tabla No. 2 Frecuencia y medidas de asociación de acuerdo a antecedentes de los pacientes

Variable	Casos (n=67)	%	Controles (n=134)	%	OR	Intervalo de confianza al 95%	<i>p</i>
Hipertensión arterial	53	79.1	106	79.1	1.00	0.48 - 2.05	0.568
Diabetes mellitus	28	41.8	30	22.4	2.48	1.32 - 4.68	0.004
EPOC	25	37.3	40	39.9	1.39	0.75 - 2.59	0.288
Enfermedad hepática	4	6.0	8	6.0	1.00	0.29 - 3.44	1.000
Enfermedad renal	19	28.4	19	14.2	2.39	1.16 - 4.92	0.016
Enfermedad hematológica	11	16.4	7	5.2	3.56	1.31 - 9.67	0.009
Enfermedad coronaria	16	23.9	37	27.6	0.82	0.41 - 1.61	0.572
Enfermedad cerebrovascular	19	28.4	16	11.9	2.91	1.38 - 6.14	0.004
Enfermedad neurológica	9	13.4	13	9.7	1.44	0.58 - 3.57	0.426
Demencia	14	20.9	10	7.5	3.27	1.36 - 7.84	0.006

Tabla No. 3 Características del proceso de hospitalización y sus medidas de asociación

Variable	Casos (n=67)	%	Controles (n=134)	%	OR	Intervalo de confianza al 95%	p
Acompañante presente	48	71.6	103	76.9	0.76	0.39 - 1.48	0.420
Condición de la hospitalización							
Médica	60	89.6	117	87.3	1.24	0.49 - 3.16	0.645
Quirúrgica	7	29.2	17	70.8			
Tipo de habitación							0.919
Individual	27	40.3	55	41.0			
Compartida	40	59.7	79	59.0			
Tipo de ingreso							
Urgencia	64	95.5	105	78.4	5.89	1.72 - 20.13	0.002
Programado	3	4.5	29	21.6			
Piso hospitalario							0.737
Segundo	25	37.3	52	38.8			
Tercero	10	14.9	23	17.2			
Cuarto	26	38.8	47	35.1			
Suites	6	9.0	12	9.0			
Tiempo de estancia en urgencias							>0.001
Promedio	3.05		1.14				
Mediana	2.00		1.00				
Desviación estándar	2.62		1.16				

^a El tipo de hospitalización y el piso hospitalario fueron variables pareadas entre los casos y los controles

Tabla No. 4 Condiciones de ingreso de los pacientes y sus medidas de asociación

Variable	Casos (n=67)	%	Controles (n=134)	%	OR	Intervalo de confianza al 95%	p
Déficit visual	24	35.8	16	11.9	4.11	1.99 - 8.47	>0.001
Déficit auditivo	41	61.2	41	30.6	3.57	1.93 - 6.60	>0.001
Déficit de la marcha	34	50.7	40	29.9	2.42	1.32 - 4.43	0.004
Portador de sonda vesical	19	28.4	10	7.5	4.90	2.12 - 11.31	>0.001
Índice de Barthel							
Independiente o dependiente leve	27	40.3	108	80.6	0.163	0.085 - 0.311	>0.001
Dependiente moderado, severo o total	40	59.7	26	19.4			
Escala de Braden							
Promedio	15.38		17.69				0.014
Mediana	16.00		18.00				
Desviación estándar	3.84		2.79				
Dolor en el traslado a piso							
Promedio	3.49		2.18				>0.001
Mediana	3.00		2.00				
Desviación estándar	2.14		1.24				
Creatinina							
Promedio	1.57		1.31				0.143
Mediana	1.1		0.9				