Impacto de los Niveles de Tacrolimus en el Rechazo al Injerto y la Tasa de Filtración Glomerular en Pacientes con Trasplante Hepático realizado en la FCI-IC entre 2009 y 2014

Camila Olarte Parra

Para optar por el título de:

Maestría en Epidemiología

Universidad del Rosario – Universidad CES

Universidad del Rosario

fci FUNDACIÓN
CARDIOINFANTIL
INSTITUTO DE CARDIOLOGÍA

UNIVERSIDAD CES
Un Compromiso con la Excelencia
Resolución del Ministerio de Educación Nacional No. 1171 del 27 de marzo de 2007

Grupo de Trabajo

Investigador Principal	Camila Olarte Parra Médica Cirujana Especialista en Epidemiología Universidad del Rosario – Universidad CES	
Coinvestigadores	Alejandra Pedraza Carvajal Médica Hospitalaria Fundación Cardioinfantil	Carlos A Benavides Viveros Cirujano de Trasplantes Fundación Cardioinfantil
	Gilberto A Mejía Hernandez Cirujano de Trasplantes Fundación Cardioinfantil	Jairo E Rivera Baquero Cirujano de Trasplantes Fundación Cardioinfantil
Asesora Metodológica	Libia M Rodriguez Padilla Bacterióloga Maestría en Epidemiología Universidad Pontificia Bolivariana

Universidad del Rosario

Formulación del Problema

Necesidad de
inmunosupresión

Incidencia de
rechazo 14-25%

Tacrolimus:
medicamento de
elección

Dosis de
tacrolimus guiada
por niveles

Rango
terapéutico

CONTENIDO

Formulación
del Problema

Marco Teórico

Hipótesis y

Objetivos

Metodología

Consideraciones

Éticas

Resultados

Discusión

Conclusiones

Osorio G et al. Rev Colomb Gastroenterol. 2013;28(2):109–13.
Staatz CE et al. Liver Transpl 2004;10:506 –512

Formulación del Problema

CONTENIDO

Formulación del Problema

Marco Teórico

Hipótesis y

Objetivos

Metodología

Consideraciones

Éticas

Resultados

Discusión

Conclusiones

Estudios en
pacientes con
trasplante
renal

Niveles =
concentración
sanguínea

Mayores
niveles, más
efectos
adversos

Formulación del Problema

CONTENIDO

Formulación del Problema

Marco Teórico

Hipótesis y

Objetivos

Metodología

Consideraciones

Éticas

Resultados

Discusión

Conclusiones

Formulación del Problema

¿Existe relación entre los niveles de tacrolimus y la presencia de rechazo agudo al injerto?

¿Existe relación entre los niveles de tacrolimus y los cambios en la TFG en pacientes con trasplante de hígado?

CONTENIDO

Formulación
del Problema

Marco Teórico

Hipótesis y

Objetivos

Metodología

Consideraciones

Éticas

Resultados

Discusión

Conclusiones

Marco Teórico

Rechazo al injerto

Diferencia
inmunológica
entre donante y
receptor

Inflamación de la
vía biliar y
endotelio

Rechazo Clínico vs
Subclínico

14% con rechazo
subclínico
requieren
tratamiento

<5% evolucionan a
rechazo crónico o
pérdida del injerto

CONTENIDO

Formulación
del Problema

Marco Teórico

Hipótesis y

Objetivos

Metodología

Consideraciones

Éticas

Resultados

Discusión

Conclusiones

Demetris AJ et al. Hepatology. 1997;25(3):658–63.
Bartlett AS et al. Liver Transpl. 2002;8(12):1147–53.

Marco Teórico

Tacrolimus y Monitoreo de Niveles

CONTENIDO

Formulación
del Problema

Marco Teórico

Hipótesis y

Objetivos

Metodología

Consideraciones

Éticas

Resultados

Discusión

Conclusiones

Figure 4: Relationship between mean trough tacrolimus concentrations during the first month after liver transplantation and the occurrence of acute cellular rejection (defined by using protocol biopsies or histologically confirmed after clinical suspicion). Each data point represents one arm from the included trials (2002–2012).

Marco Teórico

Tacrolimus y Monitoreo de Niveles

Table 3. Results of Pharmacodynamic Analysis

Event	Median Trough Concentration (ng/mL)	Interquartile Range - 25%	Interquartile Range - 75%	P Value (Rank Sum Test)
Hypomagnesemia				
Yes	7.0	5.3	7.9	0.65
No	5.7	5.3	8	
Hypertension				
Yes	5.9	5.3	7.5	0.86
No	6.5	5.3	8.1	
Hyperkalemia				
Yes	7.0	5.9	8.1	0.27
No	6.0	5.2	7.7	
Infection				
Yes	5.6	4.6	8.5	0.70
No	6.0	5.3	7.5	
Nephrotoxicity				
Yes	11.8	8.9	15.2	<0.0001
No	6.1	5.2	7.8	
Diarrhea				
Yes	8.9	7.3	10.6	0.02
No	6.0	5.2	7.7	
Glucose intolerance				
Yes	9.5	7.3	10.7	0.09
No	6.0	5.3	7.7	
Neurotoxicity				
Yes	15.1	12.9	21.7	0.01
No	6.2	5.2	7.7	
Rejection				
Yes	3.6	3.2	6.0	0.15
No	6.0	5.3	6.9	

Statz CE et al.
Liver Transpl.
2004;10:506 –512

CONTENIDO

Formulación
del Problema

Marco Teórico

Hipótesis y

Objetivos

Metodología

Consideraciones

Éticas

Resultados

Discusión

Conclusiones

Marco Teórico

Disfunción Renal Postrasplante

ERC: TFG < 60
ml/min/1,73 m²
por > 3 meses

Complicación
más frecuente

18-27%
desarrollan ERC
a los 5 años

Riesgo
atribuible de
mortalidad 13%

Inhibidores de
calcineurina

Barbier L et al. J Hepatol. 2013;59(6):1223–30.
Neuberger JM et al. Am J Transplant. 2009;9(2):327–36.
O’Riordan et al. Nephrol Dial Transplant. 2006;21(9):2630–6.

CONTENIDO

Formulación
del Problema

Marco Teórico

Hipótesis y

Objetivos

Metodología

Consideraciones

Éticas

Resultados

Discusión

Conclusiones

Marco Teórico

Disfunción Renal Postrasplante

CONTENIDO

Formulación
del Problema

Marco Teórico

Hipótesis y

Objetivos

Metodología

Consideraciones

Éticas

Resultados

Discusión

Conclusiones

Table 2. Cumulative Incidence of Chronic Renal Failure According to the Type of Transplanted Organ.*

Type of Organ	Cumulative Incidence of Chronic Renal Failure after Transplantation			Relative Risk of Chronic Renal Failure (95% CI)
	12 Mo	36 Mo	60 Mo	
	<i>percentage ±SE</i>			
Heart	1.9±0.1	6.8±0.2	10.9±0.2	0.63 (0.61–0.66)
Heart–lung	1.7±0.5	4.2±0.9	6.9±1.1	0.48 (0.36–0.65)
Intestine	9.6±2.0	14.2±2.4	21.3±3.4	1.36 (1.00–1.86)
Liver	8.0±0.1	13.9±0.2	18.1±0.2	1.00 (reference group)
Lung	2.9±0.2	10.0±0.4	15.8±0.5	0.99 (0.93–1.06)

* CI denotes confidence interval.

Marco Teórico

Disfunción Renal Postrasplante

- CONTENIDO
- Formulación del Problema
- Marco Teórico
- Hipótesis y Objetivos
- Metodología
- Consideraciones Éticas
- Resultados
- Discusión
- Conclusiones

Table 2. Multivariate analysis of factors influencing the progression to stage 5 chronic kidney disease

	<i>P</i>	OR	CI (95%)
Female gender	<0.005	7.84	2.04–30.08
Age	0.01	1.08	1.02–1.14
Tacrolimus use	<0.05	0.31	0.01–0.98
Increasing GFR from 1 year	<0.0005	0.90	0.85–0.95
Increasing creatinine from 6 months	0.001	1.05	1.02–1.08
Pre-OLT total urinary protein	<0.05	7.48	1.04–53.97
Cytomegalovirus status	NS		
Pre-OLT diabetes mellitus	NS		
Tacrolimus level	NS		
Primary biliary cirrhosis	NS		

NS, not significant; OR, odds ratio; CI, confidence interval; GFR, glomerular filtration rate measured in millilitres per minute per 1.732 of body surface area.

Hipótesis y Objetivos

Hipótesis Conceptual

- Los niveles de tacrolimus se asocian con los cambios en la TFG
- No se asocian con la presencia de rechazo agudo

Hipótesis Nula

- Los niveles de tacrolimus son independientes de la presencia de rechazo agudo al injerto hepático
- Los niveles de tacrolimus son independientes de los cambios en la TFG

Hipótesis alterna

- Existe relación entre los niveles de tacrolimus y la presencia de rechazo agudo al injerto y/o los cambios en la TFG

CONTENIDO

Formulación
del Problema

Marco Teórico

Hipótesis y
Objetivos

Metodología

Consideraciones

Éticas

Resultados

Discusión

Conclusiones

Hipótesis y Objetivos

CONTENIDO

Formulación
del Problema

Marco Teórico

Hipótesis y

Objetivos

Metodología

Consideraciones

Éticas

Resultados

Discusión

Conclusiones

Objetivo General

- Determinar la relación entre los niveles de tacrolimus y la presencia de rechazo agudo al injerto hepático
- Determinar la relación entre los niveles de tacrolimus y los cambios en la TFG

Objetivos Específicos

- Describir las características demográficas, clínicas y bioquímicas de la población de estudio
- Determinar si los niveles de tacrolimus influyen en los desenlaces
- Determinar la relación entre los niveles de tacrolimus y los desenlaces ajustando por otros factores demográficos, clínicos y bioquímicos.

Metodología

Cohorte histórica

CONTENIDO

- Formulación del Problema
- Marco Teórico
- Hipótesis y Objetivos
- Metodología**
- Consideraciones Éticas
- Resultados
- Discusión
- Conclusiones

Metodología

Población de Estudio

Criterios de Inclusión

- Adultos
- Trasplante Hepático
- FCI-IC 2009-2014
- Tacrolimus

Criterios de Exclusión

- Trasplante previo
- Trasplante combinado
- ERC pretrasplante

CONTENIDO

Formulación del Problema

Marco Teórico

Hipótesis y

Objetivos

Metodología

Consideraciones

Éticas

Resultados

Discusión

Conclusiones

Metodología

Exposición y Desenlaces

CONTENIDO

Formulación del Problema

Marco Teórico

Hipótesis y

Objetivos

Metodología

Consideraciones

Éticas

Resultados

Discusión

Conclusiones

Metodología

Análisis Multinivel

Nivel 1: Pacientes

Demográficas

Indicación de trasplante

Antecedentes

Nivel 2: Medidas repetidas

Peso y talla

Dosis y tipo de TAC

Uso de otros inmuno supresores

Perfil hepático

Función renal

Niveles de TAC

Biopsias hepáticas

CONTENIDO

Formulación del Problema

Marco Teórico

Hipótesis y

Objetivos

Metodología

Consideraciones

Éticas

Resultados

Discusión

Conclusiones

Consideraciones Éticas

- Resolución 8430 de 1993: Estudio sin riesgo
- Presentado a los Comités de Investigación y Ética de la institución donde se realizó
- Secreto profesional
- Se salvaguardará la identidad de los participantes en todas las fases de la investigación

CONTENIDO

Formulación

del Problema

Marco Teórico

Hipótesis y

Objetivos

Metodología

Consideraciones
Éticas

Resultados

Discusión

Conclusiones

Resultados

Figura 1. Proceso de selección de la población de estudio

CONTENIDO

- Formulación del Problema
- Marco Teórico
- Hipótesis y Objetivos
- Metodología
- Consideraciones Éticas
- Resultados**
- Discusión
- Conclusiones

Resultados

Tabla 1. Características demográficas y clínicas de los pacientes

Variables	n (%)
Sexo (femenino)	63 (52,5)
Edad al momento del trasplante, mediana (RIQ)	54 (43-61)
Indicación del trasplante	
Cirrosis por Hepatitis Virales	22 (18,3)
Cirrosis Alcohólica	22 (18,3)
Cirrosis Biliar Primaria	16 (13,3)
Cirrosis Autoinmune	12 (10,0)
Otras	48 (40,0)
Antecedentes	
Diabetes Mellitus	25 (20,8)
Hipertensión Arterial	15 (12,5)
Síndrome Hepatorrenal	8 (6,7)
Ascitis	72 (60,0)
Número de pacientes trasplantados por año	
2009	15 (12,5)
2010	11 (9,2)
2011	23 (19,2)
2012	23 (19,2)
2013	20 (16,7)
2014	28 (23,3)

CONTENIDO

Formulación
del Problema

Marco Teórico

Hipótesis y

Objetivos

Metodología

Consideraciones

Éticas

Resultados

Discusión

Conclusiones

Resultados

Tabla 2. Relación entre Niveles de Tacrolimus y Rechazo Clínico

Variable	Rechazo Clínico 1 (ALT y AST > 70)				Rechazo Clínico 2 (ALT y/o AST > 70)			
	OR	IC95% (LI)	IC95% (LS)	p	OR	IC95% (LI)	IC95% (LS)	p
Modelo sin ajustar								
Niveles	1,02	0,98	1,06	0,26	1,01	0,97	1,05	0,57
Modelo ajustado								
Niveles	1,03	0,99	1,07	0,21	1,02	0,98	1,07	0,28
Sexo(masculino)	0,54	0,17	1,65	0,28	0,46	0,14	1,48	0,19
Edad								
40-60	0,95	0,28	3,18	0,93	0,96	0,27	3,40	0,95
>60	0,91	0,21	3,98	0,90	0,92	0,20	4,23	0,92
Indicación								
Autoimmune	6,89	0,48	98,11	0,16	4,86	0,36	64,93	0,23
CBP	12,3	0,98	155,47	0,05	8,43	0,73	97,39	0,09
Virales	77,0	8,51	697,27	<0,001	56,37	7,17	443,33	<0,001
Otra	8,03	0,90	71,67	0,06	4,98	0,64	38,94	0,13
Micofenolato	0,92	0,52	1,62	0,77	0,91	0,52	1,59	0,75
Corticoides	1,54	0,95	2,49	0,08	1,15	0,72	1,84	0,57
Everolimus	2,60	1,16	5,84	0,02	2,79	1,26	6,20	0,01

CONTENIDO

Formulación del Problema

Marco Teórico

Hipótesis y Objetivos

Metodología

Consideraciones Éticas

Resultados

Discusión

Conclusiones

Resultados

Tabla 3. Relación entre Niveles de Tacrolimus y Rechazo confirmado por biopsia

Variable	Rechazo confirmado por biopsia			
	OR	IC95% (LI)	IC95% (LS)	p
Modelo sin ajustar				
Niveles	1,13	0,92	1,38	0,24
Modelo ajustado				
Niveles	1,40	1,02	1,92	0,04
Sexo (masculino)	1,90	0,33	10,95	0,47
Edad				
40-60	1,01	0,18	5,75	0,99
>60	15,08	0,73	311,80	0,08
Indicación				
Autoimmune	0,50	0,01	20,80	0,71
CBP	0,99	0,04	23,79	0,99
Hepatitis Virales	0,47	0,02	12,91	0,66
Otra	0,59	0,03	12,00	0,73
Micofenolato	0,11	0,004	2,83	0,18
Corticoides	1,50	0,29	10,42	0,63
Everolimus	0,11	1,16	5,84	0,34

CONTENIDO

- Formulación del Problema
- Marco Teórico
- Hipótesis y Objetivos
- Metodología
- Consideraciones Éticas
- Resultados**
- Discusión
- Conclusiones

Resultados

Tabla 4. Relación entre Niveles de Tacrolimus y TFG

Variable	Cockcroft				MDRD 4				CKD-EPI			
	β	IC95% (LI)	IC95% (LS)	p	β	IC95% (LI)	IC95% (LS)	p	β	IC95% (LI)	IC95% (LS)	p
Modelo sin ajustar												
Niveles	-0,38	-0,57	-0,18	<0,001	-0,44	-0,64	-0,25	<0,001	-0,45	-0,60	-0,30	<0,001
Modelo ajustado												
Niveles	-0,45	-0,66	-0,25	<0,001	-0,62	-0,82	-0,42	<0,001	-0,57	-0,73	-0,41	<0,001
Indicación												
Autoinmune	6,58	-9,45	22,60	0,42	-0,44	-15,13	14,25	0,95	4,42	-9,79	18,64	0,54
CBP	-3,60	-18,61	11,40	0,64	-5,47	-19,23	8,28	0,44	-1,68	-14,99	11,64	0,81
Virales	0,87	-8,29	13,90	0,90	3,49	-8,45	15,44	0,57	3,34	-8,19	14,88	0,57
Otra	3,06	-8,62	14,42	0,60	3,14	-7,28	13,56	0,56	4,02	-6,06	14,10	0,44
DM	-6,15	-16,71	4,40	0,25	-5,50	-15,19	4,18	0,27	-8,41	-17,77	0,96	0,08
HTA	-1,53	-14,31	11,25	0,81	-3,25	-14,97	8,46	0,59	-2,84	-14,19	8,49	0,62
HR	-8,53	-24,80	7,75	0,30	-4,45	-19,39	10,49	0,56	-7,07	-21,52	7,38	0,33
Ascitis	-5,22	-13,72	3,28	0,23	-7,54	-15,34	0,25	0,06	-6,01	-13,55	1,53	0,12
Micofenolato	-2,84	-5,27	-0,41	0,02	1,28	-1,17	3,74	0,31	2,24	0,32	4,16	0,02
Corticoides	3,80	1,95	5,64	<0,001	5,04	3,25	6,84	<0,001	2,80	1,40	4,21	<0,001
Everolimus	-3,45	-7,05	0,16	0,06	-1,41	-5,01	2,18	0,44	-0,43	-3,25	2,39	0,77

CONTENIDO

Formulación del Problema

Marco Teórico

Hipótesis y

Objetivos

Metodología

Consideraciones

Éticas

Resultados

Discusión

Conclusiones

Discusión

CONTENIDO

- Formulación del Problema
- Marco Teórico
- Hipótesis y Objetivos
- Metodología
- Consideraciones Éticas
- Resultados
- Discusión**
- Conclusiones

Åberg F et al. *Transpl Int.* 2007;20(7):591–9.
Cohen AJ et al. *Liver Transpl.* 2002;8(10):916–21.
O’Riordan et al. *Nephrol Dial Transplant.* 2006;21(9):2630–6.

Tabla 5. Comparación de estudios que evalúan la relación entre los niveles de tacrolimus y el rechazo

Estudio	Población	Diagnóstico	Hallazgos
Staatz (2004) Australia	<ul style="list-style-type: none"> • Edad: 5,7 años • Mujeres 60% • Trasplante hepático • Niveles TAC 7,1 • Seguimiento: 3 años 	<ul style="list-style-type: none"> • Confirmado por biopsia solicitada por sospecha clínica 	<ul style="list-style-type: none"> • Casos: Niveles TAC 6,0 • Controles: Niveles TAC 3,6 • P=0,05
Pollock (2010) Canadá	<ul style="list-style-type: none"> • Edad: 13 años • Mujeres 41% • Trasplante órganos sólidos • Niveles de TAC • Seguimiento 	<ul style="list-style-type: none"> • Confirmado por biopsia 	<ul style="list-style-type: none"> • Casos: Niveles TAC 6,2 • Controles: Niveles TAC 7,0 • P=0,70
Rodriguez-Peralvarez (2012)	<ul style="list-style-type: none"> • Revisión Sistemática 	<ul style="list-style-type: none"> • Confirmado por biopsia por protocolo o sospecha clínica, según el centro 	<ul style="list-style-type: none"> • Grupo 1: Niveles TAC 6-10 • Grupo 2: Niveles TAC >10 • P=0,66
Actual (2016) Colombia	<ul style="list-style-type: none"> • Edad: 54 años • Mujeres 52,5% • Trasplante hepático • Niveles TAC 9.9 • Seguimiento: 3,2 años 	<ul style="list-style-type: none"> • Elevación de ALT y AST • Confirmado por biopsia solicitada por sospecha clínica 	<ul style="list-style-type: none"> • ALT y AST > 70: p=0,26 • ALT y/o AST > 70: p=0,57 • Biopsia: p=0,04

CONTENIDO

- Formulación del Problema
- Marco Teórico
- Hipótesis y Objetivos
- Metodología
- Consideraciones Éticas
- Resultados
- Discusión**
- Conclusiones

Tabla 6. Comparación de estudios que evalúan la relación entre los niveles de tacrolimus y la función renal

Estudio	Población	Diagnóstico	Hallazgos
Cohen (2002) Estados Unidos	<ul style="list-style-type: none"> • Edad: 50 años • Colestasis 41%, HVC 15% • Tacrolimus 51,7% • Seguimiento ($\bar{x}$): 6,8 años 	<ul style="list-style-type: none"> • TFG por depuración de Iotalamato • TFG <40 	<ul style="list-style-type: none"> • Incidencia acumulada 27% a los 5 años
Ojo (2003) Estados Unidos	<ul style="list-style-type: none"> • Edad: 44 años • Mujeres 57,8% • HVC 21,4% • DM 9,1% e HTA 5,7% • Tacrolimus 44,5% • Seguimiento (med): 3 años 	<ul style="list-style-type: none"> • TFG por MDRD4 • TFG <30 	<ul style="list-style-type: none"> • Incidencia acumulada 18,1% a los 5 años • Factores: Edad, TFG pretx, Mujer, HVC, DM, HTA
O'Riordan (2006) Reino Unido	<ul style="list-style-type: none"> • Edad: 48 años • Mujeres 53,5% • CBP 20,9%, Alcohol 13% • DM 10,9% e HTA 6,5% • Tacrolimus 52,2% • Seguimiento (med): 5 años 	<ul style="list-style-type: none"> • TFG por MDRD4 • TFG <60 • Hallazgos anormales por > 3 meses 	<ul style="list-style-type: none"> • Prevalencia TFG<60 a los 5 años 71,1% • Incidencia acumulada 6,52% a los 10 años (TFG<30) • Factores: Edad, Mujer, Ciclosporina, Niveles (NS)
Karie-Guigues (2009) Francia	<ul style="list-style-type: none"> • Edad: 48 años • Mujeres 35% • Alcohol 31,2% y HVC 20,6% • DM 12,5% e HTA 10,5% • Tacrolimus 53,7% • Seguimiento ($\bar{x}$): 9,2 años 	<ul style="list-style-type: none"> • TFG por MDRD4 • TFG <90 	<ul style="list-style-type: none"> • Prevalencia TFG<60 a los 5 años 57,7% • Factores: Edad, TFG pretx, Micofenolato (+)
Actual (2016) Colombia	<ul style="list-style-type: none"> • Edad: 54 años • Mujeres 52,5% • Virales 18,3% y Alcohol 18,3% • DM 20,8% e HTA 12,5% • Seguimiento (med): 3,2 años 	<ul style="list-style-type: none"> • TFG por Cockcroft, MDRD4 y CKD-EPI • TFG <60 	<ul style="list-style-type: none"> • Incidencia acumulada 26,7-36,3% a los 5 años • Factores: Niveles, Corticoides (+), Everolimus, Micofenolato

CONTENIDO

Formulación del Problema

Marco Teórico

Hipótesis y Objetivos

Metodología

Consideraciones Éticas

Resultados

Discusión

Conclusiones

Conclusiones

Los niveles de tacrolimus son independientes del rechazo agudo clínico

No se pudo corroborar con biopsia hepática

Los niveles de tacrolimus tienen impacto negativo en la función renal

La correlación tiene baja importancia clínica

Se requiere más estudios para definir si es seguro disminuir la dosis del medicamento con el fin de reducir los eventos adversos

CONTENIDO

Formulación

del Problema

Marco Teórico

Hipótesis y

Objetivos

Metodología

Consideraciones

Éticas

Resultados

Discusión

Conclusiones