

publisher Universidad del Rosario

type info:eu-repo/semantics/article

type info:eu-repo/semantics/publishedVersion

title The Physical Therapy in the Rehabilitation of a Patient with Complex Regional Pain Syndrome

title Fisioterapia en la rehabilitación del usuario con síndrome doloroso regional complejo

subject complex regional pain syndrome; stress loading; loss of sensibility; relaxation

subject Síndrome doloroso regional complejo; estrés de carga; desensibilización; relajación

source Revista Ciencias de la Salud; Vol. 4, núm. 2 (2006)

source 1692-7273

source 2145-4507

source Revista Ciencias de la Salud; Vol. 4, núm. 2 (2006)

source Revista Ciencias de la Salud; Vol. 4, núm. 2 (2006)

rights <http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0>

rights info:eu-repo/semantics/openAccess

relation <http://revistas.urosario.edu.co/index.php/revsalud/article/view/570/489>

language spa

format application/pdf

description Due to its multiple causes and non-specific symptoms, the complex regional pain syndrome is one of the clinical situations that generates greater difficulty in the physical therapy treatment. It is defined as a vasomotor dysfunction, mediated by the sympathetic nervous system with a pain that grows and lingers over time and which does not tolerate the different modalities and techniques used by physical therapists. For a long time, physical therapists have had a prominent role in the management of a patient's pain, without the cause or consequence of the same one, reason for which this revision wanted to integrate therapeutic actions such as the stress loading program, the desensitization and relaxation techniques, that have given excellent results, to the traditional (physical agents, ultrasound, sedative massage and different types of current), to Traumatic or visceral, that compromises the sympathetic nervous system reflexes.

description Por sus múltiples causas y su sintomatología inespecífica, el síndrome doloroso regional complejo es una de las situaciones clínicas que mayor dificultad genera en el tratamiento fisioterapéutico. Este síndrome se define como una disfunción vasomotora, mediada por el sistema simpático en donde su manifestación primaria es un dolor que aumenta y permanece en el tiempo y que no tolera las diferentes modalidades y técnicas utilizadas por los Fisioterapeutas como herramientas de intervención. A través del tiempo el Fisioterapeuta ha tenido una acción relevante en el manejo del usuario con dolor, sin importar la causa o consecuencia del mismo. Por esta razón con esta revisión se quiere, integrar acciones terapéuticas como la carga de peso, la desensibilización y la relajación, que han dado excelentes resultados, a las prácticas tradicionales (medios físicos, ultrasonido, masaje sedativo y diferentes tipos de corrientes) aplicables a quienes padecen dolor secundario, traumático o visceral que compromete el sistema simpático en forma refleja.

identifier.uri <http://hdl.handle.net/10336/7678>

identifier <http://revistas.urosario.edu.co/index.php/revsalud/article/view/570>

date.available 2014-07-09T15:56:14Z

date.accessioned 2014-07-09T15:56:14Z

date 2010-05-18

creator Tolosa Guzmán, Ingrid

creator Ardila de Cháves, Amparo