

Anexos Técnicos

1. Encuesta

Sexo: Femenino__ Masculino__

Estrato: 1__ 2__ 3__ 4__ 5__ 6__

Edad:

Entre 20 y 30 años__ Entre 31 y 40 años__ Entre 41 y 50 años__ Entre 51 y 60 __ Mayor a 61 años__

Actividad: Estudiante__ Administrativo IPS__ Docente__

Como parte de las estrategias para la contención y manejo de la pandemia por COVID-19 se han utilizado diferentes opciones por parte de los gobiernos. No obstante, dentro de los modelos de salud no se han considerado las preferencias de la población en torno a la aplicación de estas estrategias para contener el COVID-19. Es por esta razón, mediante la siguiente encuesta se busca evaluar las preferencias y proponer así modelos para el manejo de la pandemia.

Cada pregunta será evaluada de 0 a 10, entendiendo el 0 como el peor y 10 el mejor estado de salud posible para la persona encuestada. Teniendo en cuenta que es una encuesta de preferencias, es de carácter individual y no existe respuesta equivocada.

Ejemplo: un paciente con cáncer cerebral que está afectando su visión asiste a un control médico, donde el especialista le indica que hay dos opciones para el manejo de la enfermedad. Uno es someterse a quimioterapia que tiene una posibilidad de éxito del 50% más los efectos adversos de la medicación. La segunda opción incluye una cirugía que tiene una posibilidad de éxito del 100% para recuperar la visión, pero tiene un 25% de posibilidad de fallecer durante el procedimiento. Teniendo en cuenta la escala de preferencias, el paciente considera que estar ciego tendría una calificación de 0 y el morir una de 3, por lo cual toma la decisión de someterse a la cirugía y asumir el riesgo de fallecer a costa de evitar quedar ciego el resto de su vida.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Quimioterapia

Cirugía

No obstante, se presenta el mismo caso, pero para otro paciente el cual, como parte de sus preferencias fallecer es el peor estado posible, es decir 0 y quedar ciego equivale a 6. Por lo anterior, decide que el riesgo de morirse es muy alto con la cirugía y prefiere someterse a la quimioterapia y aceptar las posibles complicaciones de la medicación, así como asumir el riesgo de perder la visión.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Cirugía

Quimioterapia

Se debe tener en cuenta que las dos opciones no pueden tener el mismo valor, una debe ser menor o mayor que la otra.

1. El riesgo de fallecer por COVID-19 varía entre el 0,1% y el 25%. Teniendo en cuenta lo anterior, usted prefiere mantener distanciamiento social (confinamiento) trabajando y/o estudiando desde casa para reducir el riesgo de contagio o prefiere salir de su vivienda asumiendo un posible contagio, el cual varía dependiendo de la actividad que desempeñe.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Distanciamiento social

Salir de la vivienda

2. Si usted conoce que el confinamiento reduce las muertes por COVID-19 del 31 al 63%, preferiría que se aplique esta medida o prefiere que se busquen otras medidas o alternativas para reducir la mortalidad de esta enfermedad.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Aplicar Confinamiento

Buscar otras medidas

3. Dentro de las medidas aplicadas para la prevención del COVID-19 está el uso de máscara facial (tapabocas); el uso exclusivo de este reduce el contagio en un 50% cuando toda la población lo usa. Teniendo en cuenta lo anterior, usted prefiere utilizar tapabocas cuando sale de su casa para evitar contagiarse o prefiere evitar el uso de este y asumir el riesgo de infectarse entendiendo que el 4% de los pacientes que se infectan requieren hospitalización.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

No usar tapabocas para prevenir COVID Usar tapabocas para prevenir COVID

4. Se ha encontrado que el uso de doble mascarilla (tapabocas) ha permitido reducir aproximadamente el contagio por COVID-19 en un 95,9%, teniendo en cuenta lo anterior usted preferiría utilizar doble mascarilla o prefiere no aplicar esta medida asumiendo el riesgo de fallecer por esta enfermedad (0,1 al 25% de los casos).

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Doble tapabocas

No usar tapabocas

5. Dentro de las medidas aplicadas para la prevención y progresión del COVID-19 está el lavado de manos; el uso exclusivo de este reduce el contagio de enfermedades respiratorias en un 21%. Teniendo en cuenta lo anterior, usted prefiere realizar un lavado de manos constante (cada 2 horas) o prefiere aplicar el confinamiento que reduce el riesgo de contagio en un 85%.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Lavado de manos constante

Confinamiento como medida preventiva

6. Los gobiernos han implementado diferentes normatividades para la prevención del COVID-19. Usted prefiere tener en cuenta estas regulaciones a la hora de realizar sus actividades diarias o prefiere no considerarlas en el ejercicio de las mismas y asumir el riesgo de una sanción por el incumplimiento de estas.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Cumplir las restricciones No cumplir las restricciones

7. Pese a las restricciones actuales por la pandemia del COVID-19 y los riesgos de contagio al realizar algunas actividades, usted prefiere mantenerse aislado en su vivienda o prefiere salir a realizar actividades lúdicas (celebración de cumpleaños, matrimonios, encontrarse con amigos)

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Aislarse en vivienda Actividades Lúdicas

8. Entendiendo los riesgos de fallecer por COVID-19 en la población mayor o con algunas comorbilidades, usted prefiere evitar visitar a sus familiares y/o amigos o prefiere realizar estas visitas indiferentes del riesgo existente.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Evitar visitas Realizar Visitas

2. Tablas consolidación de resultados:

Tabla 4. *Distribución edad en opción “Buscar otras medidas” en pregunta 2.*

PREGUNTA 2- EDAD						
Buscar otras medidas	Entre 20 y 30 años	Entre 31 y 40 años	Entre 41 y 50 años	Entre 51 y 60 años	Entre	Total general
0	11	7	3	0		21
1	7	9	1	0		17
2	4	8	9	0		21
3	8	8	4	2		22
4	3	4	6	1		14

5	8	12	2	3	25
6	8	4	2	0	14
7	9	6	1	1	17
8	7	7	3	3	20
9	5	12	3	1	21
10	57	77	44	15	193
Total general	127	154	78	26	385

Fuente: elaboración propia 2021.

Tabla 5. *Distribución por sexo en opción “No usar tapabocas para COVID-19” en pregunta 3*

PREGUNTA 3 - SEXO			
No usar tapabocas para COVID-19	Femenino	Masculino	Total general
0	194	88	282
1	21	17	38
2	8	9	17
3	4	5	9
4	4	1	5
5	2	1	3
6	2	5	7
7	2	1	3
8	1	0	1
9	2	2	4
10	11	5	16
Total general	251	134	385

Fuente: elaboración propia 2021.

Tabla 6. *Distribución sexo en opción “Usar tapabocas para prevenir COVID-19” en pregunta 3.*

PREGUNTA 3 - SEXO			
Usar tapabocas para prevenir COVID-19	Femenino	Masculino	Total general
0	4	3	7
1	5	2	7
2	6	1	7
3	12	4	16
4	2	3	5
5	3	2	5
6	1	8	9
7	10	4	14
8	48	21	69
9	13	14	27
10	147	72	219
Total general	251	134	385

Fuente: elaboración propia 2021.

Tabla 7. *Distribución sexo en opción “Doble tapabocas” en pregunta 4.*

PREGUNTA 4 - SEXO			
Doble tapabocas	Femenino	Masculino	Total general
0	7	4	11
1	5	5	10
2	10	5	15
3	13	4	17
4	7	6	13
5	9	14	23

6	24	19	43
7	12	16	28
8	61	21	82
9	15	5	20
10	88	35	123
Total general	251	134	385

Fuente: elaboración propia 2021.

Tabla 8. *Distribución por edad en opción “Doble tapabocas” en pregunta 4.*

PREGUNTA 4- EDAD					
Doble tapabocas	Entre 20 y 30 años	Entre 31 y 40 años	Entre 41 y 50 años	Entre 51 y 60 años	Total general
0	3	5	2	1	11
1	3	4	3	0	10
2	7	5	2	1	15
3	10	6	1	0	17
4	3	4	3	3	13
5	10	9	4	0	23
6	13	14	13	3	43
7	10	8	6	4	28
8	21	36	20	5	82
9	5	9	3	3	20
10	42	54	21	6	123
Total general	127	154	78	26	385

Fuente: elaboración propia 2021.